



کرچک یا روغن معدنی ، بیسمدت ، منیزیوم ، ترکیبات ضد اسهال، تنقیه با باریوم و مصرف آنتی بیوتیک خودداری نمایید. بهتر است این آزمایش در سه نوبت انجام شود.

نمونه مدفوع باید مستقیماً در ظرفی که از طرف آزمایشگاه در اختیار بیمار قرار می گیرد جمع آوری شود اگر بیمار بستری است ، نمونه در یک ظرف خشک جمع آوری نموده و سپس با استفاده از چوب مخصوص (آبسلانگ) ، نمونه را به ظرف برچسب دار منتقل نمائید. نمونه مدفوع نباید با ادرار یا آب آلوده شود زیرا ادرار می تواند برخی از انگل های فعال را از بین ببرد.

بیماران باید نمونه جمع آوری شده را خصوصاً در موارد مشکوک به اسهال خونی بلافاصله به آزمایشگاه تحویل دهند. اگر انجام آزمایش حداکثر ۳۰ دقیقه پس از جمع آوری نمونه امکان پذیر نباشد، لازم است تا نمونه در یخچال قرار داده شود.

دستور العمل جمع آوری نمونه مدفوع



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

بیمارستان صلاح الدین ایوبی

دستور العمل آموزشی

۱۴۰۳-۱۴۰۴

رایجترین کاربرد آزمایش مدفوع تشخیص انواع مختلف انگل ها بیماری زا در ورده است.

افرادی که تحت آزمایش مدفوع قرار می گیرند ، باید برای مدت ۷ تا ۱۰ روز پیش از انجام آزمایش از درمان با روغن